

Eucarbon herbal, tabletid

F. TRENKA Chem.-pharmazeutische Fabrik Ges.m.b.H.

1. Toimeaine. Senna lehtede ekstrakt, rabarberiekstrakt, pulbriline süsi, ATC-kood. T01RS01

2. Koostis. 1 tablett sisaldab:

Senna lehtede ekstrakt	105 mg, milles sennosiide 2,62...3,67 mg
Rabarberiekstrakt	25 mg, milles sennosiide 1,8...2,5 mg
Pulbrilist sütt	180 mg

Abiained vt 6.1.

3. Ravimvorm. Tablett.

Hallikasmust tablett.

4.1 Näidustused. Kõhukinnisus.

4.2 Annustamine. Täiskasvanutele ja üle 12-aastastele lastele: 1...2 tabletti kuni kolm korda ööpäevas söögi ajal või pärast sööki. Selline annus omab kergelt lahtistavat toimet ning vähendab kõhupuhitust. Tugevama lahtistava toime saavutamiseks suurendada annust 3...4 tabletti, mis võtta sisse õhtul.

Üle 2-aastastele lastele (ainult lastearsti soovitusel): 1/2...1 tablett kuni kolm korda ööpäevas koos toiduga.

Manustamisviis. Eucarbon herbal tablette võetakse suu kaudu koos piisava hulga vedelikuga.

4.3 Vastunäidustused. Ülitundlikkus ravimi või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

Soolesulgus, soolte ägedad põletikulised haigused, teadmata põhjusel tekkinud kõhuvalud. Tõsised häired vee ja elektrolüütide tasakaalus.

Vastunäidustatud alla 2-aastastele lastele.

4.4 Hoiatused. Annustamine on individuaalne. Tugev kõhulahtisus viitab üleannustamisele.

Ei sobi kõhnumist soodustavaks preparaadiks.

4.5 Koostoimed. Eucarbon herbal tabletid võivad põhjustada hüpokaleemiat, mille tulemusena võib tugevneda südameglükosiidide toime.

4.6 Rasedus ja imetamine. Eucarbon herbal tablette võib raseduse ja imetamise ajal kasutada vaid arsti nõusolekul.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele. Pole teada.

4.8 Kõrvaltoimed. Soovitatud annuste kasutamisel esineb kõrvaltoimeid (kõhuvalu ja kõhulahtisust) väga harva.

Leeliselise reaktsiooni tõttu võib uriin värvuda kahvatupunaseks, mis ei oma kliiniliselt olulist tähendust.

Senna ja rabarberi sisaldumise tõttu preparaadis ei saa jätta välistamata ka antrakinooni derivaatidel põhinevate lahtistite kesknärvisüsteemi poolsest toimest tulenevat iiveldust ning oksendamist.

Pikaajalisel kasutamisel võib täheldada elektrolüütide (eriti kaaliumi) kadu, mis võib põhjustada soolestiku töö loidust (soolestiku atoonia ja kõhukinnisus).

4.9 Üleannustamine. Üleannustamise sümptomiks on kõhulahtisus, mille ilmnemisel peaks kas preparaadi kasutamise lõpetama või annust vähendada.

5.1 Farmakodünaamika.

Eucarbon herbal tabletid sisaldavad vaid taimseid toimeaineid. Preparaadi kerge lahtistav, kõhupuhituse vastane toime tuleneb söe võimest siduda erinevaid toksilisi ühendeid (lisaks ka eeterlike õlide komponentide toimest) ning moodustunud komplekside lihtsustatud eliminatsioonist tänu senna lehtede ja rabarberiekstrakti lahtistavale toimele.

Eucarbon herbal tabletid omavad ka kergelt desinfitseerivat toimet seedetraktile.

Lahtistava toime saavutamiseks peab manustatavaks sennosiidide (A ja B) annuseks olema 15...30 mg. Kuna Eucarbon herbal tablettides on sennosiidide sisaldus suhteliselt madal, siis peab igal üksikul juhul annust reguleerima, vastavalt soolesisu tihedusele.

Eucarbon herbal tablettide lahtistav toime ilmneb 8...10 tunni möödumisel preparaadi sissevõtmisest.

5.2 Farmakokineetika. Eucarbon herbal tablettide baasil pole farmakokineetilisi uuringuid läbi viidud.

6.1 Abiainete loetelu. Mündiõli, ristikõõmne õli, suhkur, maisitärklis, kummiaraabikum, kaoliin, talk.

6.2 Sobimatus. Pole teada.

6.3 Kõlblikusaeg. 3 aastat.

6.4 Säilitamise eritingimused. Hoida temperatuuril kuni 30 °C, valguse eest kaitstult.

6.5 Pakend. 10 tabletti pakendatud PVC-alumiiniumblistrisse; blisterpakend ja pakendi infoleht pappkarbis.

10 tabletti pakendatud PVC-alumiiniumblistrisse; 3 blisterpakendit ja pakendi infoleht pappkarbis.

10 tabletti pakendatud PVC-alumiiniumblistrisse; 5 blisterpakendit ja pakendi infoleht pappkarbis.

10 tabletti pakendatud PVC-alumiiniumblistrisse; 10 blisterpakendit ja pakendi infoleht pappkarbis.

10 tabletti pakendatud PVC-alumiiniumblistrisse; 50 blisterpakendit ja pakendi infoleht pappkarbis..